UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG/2015

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de **TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MORFOLOGIA**. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no conjunto de ideias que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também foram aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída consideraram os diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

Questão	01

Preparo da solução A: Espera-se que o candidato utilize: 1 bastão de vidro (item 8); 1 becker de capacidade de 500 mililitros (item 10); 3,6 gramas de cloreto de sódio (item 13); água destilada (item 3) até completar o volume de 400 mililitros de solução final. Para preparar 400 mililitros de solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9% é necessário pesar 3,6 gramas de cloreto de sódio em balança de precisão e diluí-lo em água destilada, dentro de um Becker e com auxílio do bastão de vidro, até que se completem 400 mililitros de solução final.

<u>Preparo da solução B</u>: Espera-se que o candidato utilize: 1 bastão de vidro (item 8); 1 becker de capacidade de 500 mililitros (item 10); 1 proveta com capacidade de 100 mililitros (item 16); 140 mililitros de álcool etílico P.A. (item 4); 60 mililitros de água destilada (item 3). Mistura-se, dentro de um bécker e com o auxílio de um bastão de vidro, 140 mililitros de álcool etílico e 60 mililitros de água destilada, medidos previamente com o auxílio de uma proveta.

Preparo da solução C: Espera-se que o candidato utilize: 1 bastão de vidro (item 8); 1 becker de capacidade de 50 mililitros (item 9); 0,15 gramas de azul de metileno (item 6); água destilada (item 3) até completar o volume de 30 mililitros de solução final. Para preparar 30 mililitros de solução aquosa de azul de metileno a 0,5% é necessário pesar 0,15 gramas de azul de metileno em balança de precisão e diluí-lo em água destilada, dentro de um becker e com o auxílio do bastão de vidro, até que se completem 30 mililitros de solução final.

(20 pontos)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS CENTRO DE SELEÇÃO

O procedimento efetuado pelo técnico foi inadequado considerando a conservação do cadáver, pois os constituintes teciduais que formam os diferentes órgãos corporais se degradam rapidamente se não forem fixados por determinados agentes químicos. Após o descongelamento, o técnico deveria ter lavado o corpo abundantemente em água corrente e promovido a fixação por perfusão e imersão em uma solução apropriada para fixação dos tecidos biológicos. A fixação normalmente é feita com substâncias como o formaldeído, pois ele penetra nos tecidos biológicos protegendo as células contra a ação de suas próprias enzimas e contra a degradação por micro-organismos, como fungos e bactérias. Inicialmente, deve-se realizar a fixação por perfusão via grandes vasos. Deve-se promover também a aplicação do fixador via intramuscular e por preenchimento de cavidades. Em seguida, o cadáver deve ser imerso em uma cuba com fixador por cerca de seis meses. Depois deste período de fixação, o corpo deve ser lavado por 24 horas em água corrente. Uma vez completada a fixação, o cadáver pode ser dissecado ou, ainda, pode ser submetido à glicerinação.

(20 pontos)

Questão 03

O procedimento adequado seria a limpeza de todo sistema óptico do microscópio, utilizando-se um tecido macio, limpo e seco, embebido em uma solução própria para remoção de óleo, como, por exemplo, uma solução de álcool-éter ou éter-clorofórmio. As partes do microscópio que deveriam ser devidamente higienizadas são as lentes oculares, lentes objetivas e a lente condensadora.

(10 pontos)